

WYKAZ PROPONOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SEZONIE 2022

Podstawą opracowania powyższego niepełnego wykazu był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wg stanu na dzień 28.01.2022 r.

Rejestr wszystkich dopuszczonych i zarejestrowanych środków ochrony roślin jest zamieszczony na stronie Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi.

Papryka - PRZED SIEWEM							
L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Max ilość zabiegów	Uwagi	Substancja czynna
1	patogeny odglebowe	BASAMID	500 kg /ha	nd	1	Jesienią odkażanie termiczne ziemi. Basamid stosować od końca sierpnia do połowy października lub wiosną od końca marca do połowy kwietnia gdy zakres temp. w górnej warstwie gleby wynosi 6-27 ⁰ C.	dazomet
2	zgorzel siwek, chorobotwórcze grzyby glebowe	Brak środków do zaprawiania nasion papryki.					
3	zgnilizna twardzikowa	CONTANS WG	0,8 g/m ² ; 8 kg/ha	nd	1	Stosować 10-30 dni przed planowanym siewem lub sadzeniem.	coniothyrium minitans
Papryka - OCHRONA ROZSADY							
4	patogeny odglebowe	Para wodna, temperatura ziemi 80-90 ⁰ C przez 20 minut				Jesienią odkażać termicznie ziemię lub substraty do produkcji rozsady. Użytkować podłoże bezpośrednio po ostygnięciu podłoża - do 3 dni po zabiegu lub miesiąc po zabiegu.	bakterie glebowe
Papryka - OKRES WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN							
5	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	POLYVERSUM WP	0,15 kg	nd	6	Opryskiwać rośliny 2-4 razy co 7 dni w okresach dużego zagrożenia lub po wystąpieniu pierwszych objawów.	pythium oligandrum
		SERENADE ASO	8,0 l	nd	6		bacillus subtilis
6	antraknoza	SERENADE ASO	8,0 l	nd	6	Środki stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Scorpion 325 SC zarejestrowany jest również przeciwko brunatnej plamistości liści i mączniakowi prawdziwemu. Ortiva Top 325 SC i Tarantula 325 SC zarejestrowane również do zwalczania brunatnej plamistości liści.	bacillus subtilis
		TARANTULA 325 SC	1,0 l	3	1		azoksystrobina + difenokonazol
		SCORPION 325 SC	1,0 l	3	1		
		ORTIVA TOP 325 SC	1,0 l	3	1		
		NORDOX 75 WG	1,33 kg	10	3		miedź
7	mączniak prawdziwy	ARMICARB SP	3,0 kg	nd	6	Armicarb SP i Karbicare SP stosować zapobiegawczo, od fazy rozwoju liści do pełnej dojrzałości owocu, gdy owoce mają typową barwę. Pozostałe środki stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie.	wodorowęglan potasu
		KARBICURE SP	3,0 kg	nd	6		wodorowęglan potasu
		FLOSUL	3,0 l	3	6		siarka
		SCORPION 325 SC	1,0 l	3	1		azoksystrobina + difenokonazol
		ORTIVA TOP 325 SC	1,0 l	3	1		
		TARANTULA 325 SC	1,0 l	3	1		
		DISCUS 500 WG	0,5 kg	3	3		krezoksym matylu
8	antraknoza, fytoftoroz a i inne choroby grzybowe	NORDOX 75 WG	1,33 kg	10	3	Stosować od fazy rozwiniętych 5 liści właściwych do fazy początku dojrzwania owoców.	tlenek miedzi
9	przędziorek chmielowiec	AFIK	0,20%	nd	n.w	Lustracja roślin: stwierdzenie 10% roślin z objawami żerowania szkodnika. Stosować po przekroczeniu grogu zagrożenia.	polisacharydy
		EMULPAR 940 EC	1,20%	nd	n.w		olej z lnianki
		SILTAC EC	0,05-0,07%	nd	n.w		związki silikonowe

L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Max ilość zabiegów	Uwagi	Substancja czynna
10	<i>wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni</i>	<i>ACELAN 20 SP + SLIPPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14	3	Lustracja roślin: wykrycie pojedynczych larw i osobników dorosłych na 10 kolejnych roślinach. Stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liściado końca fazy gdy 40 % owoców uzyskuje typową barwę. Rośliny opryskiwać nie więcej niż 3 razy w sezonie co 7-10 dni.	acetamipryd
		<i>ACEPLAN 20 SP + SLIPPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14	3		acetamipryd
		<i>ACETAMOC + SLIPPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14	3		acetamipryd
		<i>KOBE 20 SP + SLIPPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14	3		acetamipryd
		<i>LANMOS 20 SP + SLIPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14	3		acetamipryd
		<i>MOSPILAN 20 SP + SLIPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14	3		acetamipryd
		<i>SEKIL 20 SP + SLIPPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14	3		acetamipryd
		<i>EMULPAR 940 EC</i>	0,9-1,2%	nd	n.w		olej z lnianki
		<i>SILTAC EC</i>	0,15-0,2%	nd	n.w		związki silikonowe
11	<i>zmienik lucernowiec; mszyce</i>	<i>ACELAN 20 SP</i>	0,2 kg	14	1	Lustracja roślin: wykrycie 2 osobników na 1 m ² uprawy, w 8-10 kolejnych roślinach. Stosować jeden z nich, raz w sezonie od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy owoce osiągną typową barwę, nie więcej niż jden zabieg w sezonie.	acetamipryd
		<i>ACEPLAN 20 SP</i>	0,2 kg	14	1		acetamipryd
		<i>ACETAMOC</i>	0,2 kg	14	1		acetamipryd
		<i>KOBE 20 SP</i>	0,2 kg	14	1		acetamipryd
		<i>LANMOS 20 SP</i>	0,2 kg	14	1		acetamipryd
		<i>MOSPILAN 20 SP</i>	0,2 kg	14	1		acetamipryd
		<i>SEKIL 20 SP</i>	0,2 kg	14	1		acetamipryd
12	<i>mszyce</i>	<i>EMULPAR 940 EC</i>	0,90%	nd	n.w	Lustracja roślin: stwierdzenie pojedynczych koloni mszyc na 10% roślin. Stosować jeden znich, nie więcej niż 2 razy w sezonie co 10-14 dni. Stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego liścia do końca fazy, gdy 10% owoców uzyska typową barwę.	olej z lnianki
		<i>SILTAC EC</i>	0,05-0,07%	nd	n.w		związki silikonowe
13	<i>piętnówka kapustnica</i>	<i>LEPINOX PLUS</i>	1,0 kg	1	3	Lustracja roślin: wykrycie 4-5 gąsiennic na 50 kolejnych roślinach. Stosować w okresie wylęgania się gąsiennic. Max wykonać 3 zabiegi nie częściej, niż co 7 dni.	bacillus thuringensis
		<i>FLORBAC</i>	1,0 kg	1	3		bacillus thuringensis
		<i>XEN TARI WG</i>	1,0 kg	1	3		bacillus thuringensis
		<i>XTREEM</i>	1,0 kg	1	3		bacillus thuringensis
14	<i>słonecznica orzęźwka</i>	<i>AFFIRM 095 SG</i>	1,5 kg	3	3	Zabiegi wykonywać wg sygnalizacji nie częściej niż 3 razy w sezonie i nie częściej niż co 7 dni.	acetamipryd
		<i>XEN TARI WG</i>	1 kg	1	3		bacillus thuringensis
		<i>XTREEM</i>	1 kg	1	3		bacillus thuringensis
15	<i>rolnice</i>	<i>AFFIRM 095 SG</i>	1,5 kg	3	2	Stosować do 2 razy w sezonie i nie częściej, niż co 7 dni.	acetamipryd
ZWALCZANIE CHWASTÓW							
Obecnie brak jest zarejestrowanych środków do zwalczania chwastów w uprawie papryki, dlatego też plantacje tej rośliny należy zakładać na polach utrzymanych w dobrej kulturze, o niewielkim zachwaszczeniu. Chwasty należy usuwać mechanicznie lub ręcznie.							

n.w. - nie wymagane

nd - nie dotyczy

** - Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania

UWAGA :

Odpowiedzialność za skuteczność działania ⁽¹⁾ i fitotoksyczność ⁽²⁾ danego środka ochrony roślin stosowanego w wymienionej uprawie ponosi wyłącznie jego użytkownik !

(1) skuteczność działania : środki stosować zgodnie z przeznaczeniem po dokładnym zapoznaniu się z etykietą, dobierać właściwy środek, nie dopuszczać do przekraczania dawek , okresów karencji, nie opóźniać zabiegu, przechowywać środki ochrony roślin w szczelnie zamkniętych pojemnikach

(2) fitotoksyczność : niekorzystny wpływ "toksyczny" substancji na rośliny, np. przekraczanie dawek środków ochrony roślin w zabiegach agrotechnicznych, tj. pestycydów, herbicydów lub fungicydów

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zaieszczoną w etykiecie.