

WYKAZ PROPONOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SEZONIE 2022

Podstawą opracowania powyższego niepełnego wykazu był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wg stanu na dzień 28.01.2022 r.

Rejestr wszystkich dopuszczonych i zarejestrowanych środków ochrony roślin jest zamieszczony na stronie Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi.

Porzeczka czarna - PRZED KWITNIENIEM						
L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
1	amerykański mączniak agrestu	podczas wiosennych lustracji i cięcia, usuwać pędy z objawami porażenia				
		SIARKOL 80 WP/ 80 WG/ EXTRA 80 WP/ BIS 80 WG/ 800 SC	3,0-5,0 kg	7	Stosować tylko podatne odmiany, zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów. Fungicydy siarkowe, Topas/ Pallas/ Penkona 100 EC stosować max 2 razy. Discus 500 WG i Nimrod 250 EC - 3 razy, środki benzimidazolowe - 1 raz w sezonie. Topas/ Pallas/ Penkona 100 EC stosować w temperaturze powyżej 12°C. *Środki ograniczają występowanie choroby.	siarka
		NIMROD 250 EC	0,75-1,5 l	14		bupirymat
		DISCUS 500 WG	0,2 kg	21		krezoksym metylu
		TOPAS/ PALLAS/ PENKONA 100 EC	0,5 l	20		penkonazol
		ARMICARB/ KARBICURE SP*	5,0 kg	1		wodorowęglan potasu
LIMOCIDE/ PREV+AM/ PESTICOL*	2,4 l	14	olejek pomarańczowy			
2	antraknoza (opadźina) liści porzeczki, biała plamistość liści	SIGNUM/ AGRIA BOS-PIRAK/ SIGNIS BIS/ SIGNIS MAX/ SPEKTOR 33 WG/ VIMA-BOSKASTROBINA	1,8 kg	3	Opryskiwać bezpośrenio przed kwitnieniem. Fungicydy z poszczególnych grup stosować przemienne. Jeden ze środków benzimidazolowych - 1 raz, a Signum 33 WG i odpowiedniki oraz Zato 50 WG do 2 razy w sezonie.	piraklostrobina + boskalid
		ZATO 50 WG	0,2 kg	14		trifloksystrobina
		SWITCH/ FLUDIOCYP PRO 62,5 WG	0,8-1,0 kg	7		cyprodynil + fludioksonil
		MIEDZIAN 50 WP/ MIEDZIAN EXTRA 350 SC	3,0 kg	7		miedź
		KARES 350 SC	3,0 l	7		miedź
3	zamieranie pędów	SWITCH/ FLUDIOCYP PRO 62,5 WG	0,8-1,0 kg	7	Zabiegi rozpocząć gdy nowe pędy osiągną długość 10-20 cm, następnie podczas kwitnienia. Środek stosować maksymalnie 3 razy w sezonie.	cyprodynil + fludioksonil
4	wielkopąkowiec porzeczkowy	SIARKOL EXTRA 80 WP stosowany do zwalczania amerykańskiego mączniaka agrestu będzie jednocześnie ograniczał wielkopąkowca porzeczkowego. Stosować w okresie pękania pąków (około trzy tygodnie przed kwitnieniem).				
5	krzywik porzeczkwiaček	ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14	Opryskiwanie wskazane tylko na zagrożonych plantacjach, głównie uszkodzonych w poprzednim roku. Wykonać je w czasie pękania pąków liściowych, zwykle w marcu lub na początku kwietnia.Lokalnie na plantacjach silnie uszkodzonych w poprzednim roku, mogą być potrzebne nawet 2-3 zabiegi w okresie rozwoju pąków. *Stosować jeden z nich.	acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC*	0,2 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
6	mszyca porzeczkowo-czysćiecowa i inne gatunki mszyc	ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14	Mszyca porzeczkowo-czysćiecowa powoduje zniekształcenia i przebarwienie liści na kolor żółto-czerwony. Zastosowane preparaty do zwalczania mszyc mszyc tuż przed kwitnieniem ograniczają jednocześnie pryszczarka porzeczkowiaka kwiatowego. *Stosować jeden z nich raz w sezonie. **Stosować raz w sezonie jeden z nich.	acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC*	0,2 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		DELTA 50 EW**	0,25 l	7		deltametryna
		DECIS MEGA 50 EW**	0,25 l	7		deltametryna
7	pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy	Brak dostępnych środków do zwalczania tego szkodnika			Zwalcznie konieczne na plantacjach, na których odnotowano uszkodzenia w poprzednim sezonie.	

L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
8	szkodniki zjadające liście: plamiec agreściak, pryszczarek porzeczkowiak liściowy, zwójkówki liściowe	ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14	Zabieg potrzebny w razie liczego pojawienia się szkodników, po zauważeniu pierwszych uszkodzeń liści. Preparaty Acelan 20 SP, Aceplan 20 SP, Acetamoc, Kobe 20 SP, Mospilan 20 SP, Miros 20SP, Lamnos 20 SP, Sekil 20 SP, ograniczają jednocześnie mszyce. Spin or 240 SC zwalcza tylko gąsiennice zwójkówek. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dla pszczół. Preparaty zawierające acetamipryd można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha *Stosować jeden z nich. **Stosować jeden z nich. ***Stosować jeden z nich.	acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP ^o	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC ^o	0,2 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SPIN TOR 240 SC	0,32-0,4 l	3		spinosad
		XEN TARI WG***	1,0-1,2 kg	nd		bacillus thuringiensis
		BIOBIT***	0,5-1,0 kg	1		bacillus thuringiensis
		DIPEL DF***	0,5-1,0 kg	1		bacillus thuringiensis
		FLORBAC***	1,0-1,2 kg	1		bacillus thuringiensis
		XTREEM***	1,0-1,2 kg	1		bacillus thuringiensis
		SPRUZIT Koncentrat na szkodniki EC	10,0 l	3		substancja z grupy naturalnych
9	przędziorek chmielowiec	KOROMITE 10 EC*	1,25 l	nd	Limocide, Prev-AM, Pesticol stosować do końca fazy rozwoju kwiatostanu. *Stosować jeden z nich. **Stosować jeden z nich.	milbemektyna
		MILBEKNOCK 10 EC*	1,25 l	nd		milbemektyna
		ORTUS 05 SC	1,5 l	21		fenpiroksymat
		LIMOCIDE**	2 l	14		olejek pomarańczowy
		PREV-AM**	2,0 l	1		olejek pomarańczowy
		PESTICOL**	2,0 l	1		olejek pomarańczowy
10	misecznik śliwkowiec	TREOL 770 EC	1,75%	nd	Środek stosować wczesną wiosną, na początku okresu wegetacji, w fazie pękania pąków	olej parafinowy
11	zwójka różoweczka	SPIN TOR 240 SC*	0,32-0,4 l	3	Opryskiwać w okresie wylęgania się gąsiennic, tuż przed kwitnieniem, na plantacjach, gdzie stwierdzono zimujące jaja zwójki różoweczki. Preparaty zawierające acetamipryd można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha.	spinosad
		MAX SPIN ^o	0,32-0,4 l	nd		spinosad
		ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP ^o	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC ^o	0,2 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		DECIS MEGA 50 EW***	0,25 l	7		deltametryna
		DELTA 50 EW***	0,25 l	7		deltametryna
12	skoczki	LIMOCIDE*	2,4 l	14	Stosować od fazy, gdy pędy osiągają 90% typowej długości do końca fazy rozwoju kwiatostanu. *Stosować jeden z nich.	olejek pomarańczowy
		PREV-AM*	2,4 l	1		olejek pomarańczowy
		PESTICOL*	2,4 l	1		olejek pomarańczowy
Porzeczka czarna - KWITNIENIE						
13	rewersja porzeczki czarnej	Dokładna lustracja plantacji i usuwanie porażonych krzewów. Zwalczanie wielkopąkowca ogranicza rozprzestrzenianie się rewersji.				
14	szara pleśń	BISZOP/ ELCAPPO/ KAPELAN/ KAPLAN/ PASTOR 80 WG	1,9 kg	7	Stosować od początku kwitnienia. Switch 62,5 WG maksymalnie 3 razy w sezonie, Luna Sensation 500 SC - 2 razy, *Środki ograniczają występowanie choroby.	kaptan
		SERENADE ASO*	8,0 l	nd		kaptan
		BOTECTOR*	1,0 kg	1		aureobasidium pullulans
		POLYVERSUM WP*	0,15 kg	nd		kaptan
		LUNA SENSATION 500 SC	0,6-0,8 l	7		fluopyram + trifloksystrobina
		SWITCH/ FLUDIOCYP PRO 62,5 WG	0,8-1,0 kg	7		cyprodynil + fludioksonil
		TELDOR 500 SC	1,5 l	5		fenpiroksymat
		SCALA	2,0 l	3		pirymetanil
15	owocnica porzeczkowa	ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14	Zabieg potrzebny tylko lokalnie na plantacjach zasiedlonych i uszkodzonych w poprzednim roku. Opryskiwać na początku pełni kwitnienia i powtórzyć po pełni kwitnienia porzeczki. Do rejestracji przebiegu lotu owocnicy można wykorzystać żółte tablice lepowe. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa pszczół. *Stosować jeden z nich.	acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP ^o	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC ^o	0,2 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SPRUZIT Koncentrat na szkodniki EC	10,0 l	3		substancja z grupy naturalnych

L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
16	wielkopąkowiec porzeczkowy	ORTUS 05 SC*	1,5 l	21	Preparaty stosować od początku do pełni kwitnienia. Preparaty można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,1 l/ha *Stosować jeden z nich.	fenpiroksymat
		AMARANT 05 SC*	1,5 l	21		fenpiroksymat
17	wciornastek różówek	SPIN TOR 240 SC*	0,32-0,4 l	3	Na zagrożonych uprawach stosować od początku do pełni kwitnienia. *Stosować jeden z nich.	spinosad
		MAX SPIN®	0,32-0,4 l	nd		spinosad
Porzeczka czarna - PO KWITNIENIU						
18	antraknoza (opadżina) liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa	MIEDZIAN 50 WP/ MIEDZIAN EXTRA 350 SC	3 l	7	Pierwsze opryskiwanie wykonać bezpośrednio po kwitnieniu, dalsze przeciętnie, co 10-14 dni. Zabiegi przeciwko rdzy wejmutkowo-porzeczkowej rozpocząć w połowie czerwca.	miedź/ tlenochlorek miedzi
		SIGNUM/ AGRIA BOS-PIRAK/ SIGNIS BIS/ SIGNIS MAX 33 WG/ VIMA-BOSKASTROBINA	1,8 kg	3		piraklostrobina + boskalid
		ZATO 50 WG	0,2 kg	14		trifloksystrobina
		LUNA SENSATION 500 SC	0,6-0,8 l	7		fluopyram + trifloksystrobina
		SWITCH/ FLUDIOCYP PRO 62,5 WG	0,8-1 kg	7		cyprodynil + fludioksonil
		KARES 350 SC	3,0 l	7		miedź
19	amerykański mączniak agrestu	NIMROD 250 EC	0,75-1,5 l	14	Pierwsze opryskiwanie wykonać około 2 tygodnie po kwitnieniu, dalsze przeciętnie, co 10 dni tylko na odmianach podatnych. Wyższe z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby. Fungicydy siarkowe, Luna Sensation 500 SC, Zato 50 WG, oraz Topas/ Pallas/ Penkona 100 EC stosować maksymalnie -2 razy, Discus 500 WG i Nimrod 250 EC- 3 razy, jeden ze środków benzimidazolowych raz w sezonie. *Środki ograniczają występowanie choroby.	bupirymat
		ZATO 50 WG	0,2 kg	14		trifloksystrobina
		DISCUS 500 WG	0,2 kg	21		krezoksym metylu
		TOPAS/ PALLAS/ PEKONA 100 EC	0,5 l	20		penkonazol
		SIARKOL 80 WP/ 80 WG/ EXTRA 80 WP/ BIS 80 WG/ 800 SC	3-5 kg	7		siarka
		LUNA SENSATION 500 SC	0,6-0,8 l	7		fluopyram + trifloksystrobina
		ARMICARB/ KARBICURE SP®	5 kg	nd		wodowęglan potasu
		SERENADE ASO*	8,0 l	nd		bacillus subtilis
		LIMOCIDE/ PREV-AM/ PESTICOL*	2,4 l	1		olejek pomarańczowy
20	szara pleśń	SWITCH/ FLUDIOCYP PRO 62,5 WG	0,8-1 kg	7	Switch/Fludiocyp Pro 62,5 WG i Teldor 500 SC stosować max - 3 razy, a Luna Sensation 500 SC- 2 razy w sezonie. *Środki ograniczają występowanie choroby.	cyprodynil + fludioksonil
		TELDOR 500 SC	1,5 l	5		fenpiroksymat
		SCALA	2,0 l	3		pirymetanił
		LUNA SENSATION 500 SC	0,6-0,8 l	7		fluopyram + trifloksystrobina
		BISZOP/ EL CAPPO/ KAPELAN/ KAPLAN/ PASTOR 80 WG	1,9 kg	7		kaptan
		POLYVERSUM WP*	0,15 kg	nd		pythium oligandrum
		SERENADE ASO*	8,0 l	nd		bacillus subtilis
		BOTECTOR*	1,0 kg	1		aureobasidium pullulans
21	wielkopąkowiec porzeczkowy	MOVENTO 100 SC	0,75 l	14	Stosować po kwitnieniu, od początku rozwoju owoców do fazy zaawansowanego dojrzewania.	spinosad
		XEN TARI WG**	1,0-1,2 kg	1	bacillus thuringiensis	
		BIOBIT**	0,5-1,0	1	bacillus thuringiensis	
		DIPEL DF**	0,5-1,2	1	bacillus thuringiensis	
		FLORBAC**	1,0-1,2	1	bacillus thuringiensis	
		XTREEM**	1,0-1,2	1	bacillus thuringiensis	
		SPRUZIT Koncentrat na szkodniki EC	10,0 l	3	substancja z grupy naturalnych	

L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
23	mszyce	MOVENTO 100 SC	0,75 l	14	Zabieg wykonać po zauważeniu mszyc, zwykle tuż po kwitnieniu. Preparaty zwalczają jednocześnie inne szkodniki. Przestrzegać okresu karencji. *Stosować raz w sezonie jeden z nich.	spinosad
		SPRUZIT Koncentrat na szkodniki EC	10,0 l	3		substancja z grupy naturalnych
		DECIS MEGA 50 EW*	0,25 l	7		deltametryna
		DELTA 50 EW*	0,25 l	7		deltametryna
		PATRIOT 100 EC*	0,125 l	7		deltametryna
24	pryszczonek porzeczkowiec pędowy, pryszczonek porzeczkowiak liściowy, przeziernik porzeczkowiec	MOVENTO 100 SC	0,75 l	14	Zabieg wykonać po zauważeniu larw pryszczarka, najczęściej tuż po kwitnieniu i powtórzyć po 10-14 dniach. Preparaty zwalczają również obecne na krzewach motyle przeziernika porzeczkowca. *Stosować jeden z nich.	spinosad
		MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
25	przędziorek chmielowiec	MOVENTO 100 SC	0,75 l	14	Zwalczać po przekroczeniu progu zagrożenia. Ortus 05 SC stosować max-2 razy w sezonie. Movento 100 SC stosować po kwitnieniu, od początku rozwoju owoców do fazy dojrzewania. Limocide, Prev-AM, Presticol stosować od końca fazy kwitnienia do fazy początku zbioru owoców. *Stosować jeden z nich.	spinosad
		LIMOCIDE 10 SC	2,0 l	1		olejek pomarańczowy
		ORTUS 05 SC	1,5 l	21		fenpiroksymat
		PREV-AM*	1,0 l	1		olejek pomarańczowy
		PESTICOL*	2,0 l	1		olejek pomarańczowy
		SILTAC EC	0,15%	nd		polimeryczne związki silikonowe
		EMULPAR 940 EC	0,9-1,2 %	nd		olej rydzowy i środki emulgujące
26	muszka plamoskrzydła	MAX SPIN®	0,32-0,4 l	3	Zwalczać na zagrożonych plantacjach, krótko przed zbiorem owoców. Pierwszy zabieg w okresie dojrzewania owoców po 3-4 dniach od stwierdzenia szkodnika w pułapkach. *Stosować jeden z nich.	spinosad
		PATRIOT 100 EC	0,125 l	7		deltametryna
		SPIN TOR 240 SC*	0,32-0,4 l	3		spinosad
Porzeczka czarna - PO ZBIORZE						
27	chrząszcze opuchlaków	Zwalczanie może być potrzebne tylko na zagrożonych plantacjach. Obecnie brak zarejestrowanych środków ochrony roślin do zwalczania tych szkodników. Ograniczane są podczas zwalczania pryszczarka pędowego i przeziernika porzeczkowca.				
28	amerykański mącznik agrestu	ZATO 50 WG	0,2 kg	nd	Po dużym nasileniu choroby opryskiwanie wykonać bezpośrednio po zbiorze, a drugie po 10-14 dniach.	trifloksystrobina
		TOPAS/ PALLAS/ PENKONA 100 EC	0,5 l	nd		penkonazol
29	antraknoza (opadlina) liści porzeczki	ZATO 50 WG	0,2 kg	nd	Na plantacjach, na których występują choroby, opryskiwanie wykonać bezpośrednio po zbiorze, a następnie po 14 dniach.	trifloksystrobina
30	pryszczonek porzeczkowiak liściowy, pryszczerek porzeczkowiec pędowy	MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	nd	Zabieg wykonać bezpośrednio po zbiorze owoców i na silnie zasiedlonych plantacjach, powtórzyć 1-2 razy w odstępach 10- dniowych. *Stosować jeden z nich.	acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	nd		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	nd		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	nd		acetamipryd
31	przędziorek chmielowiec	ORTUS 05 SC	1,5 l	nd	Dokładnie opryskiwać dolną stronę liści. *Stosować jeden z nich.	fenpiroksymat
		KOROMITE 10 EC*	1,25 l	nd		milbemektyna
		MILBEKNOCK 10 EC*	1,25 l	nd		milbemektyna
		SILTAC EC	0,15%	nd		polimeryczne związki silikonowe
		EMULPAR 940 EC	0,9-1,2%	nd		olej rydzowy i środki emulgujące
32	przeziernik porzeczkowiec	Brak dostępnych środków do zwalczania tego szkodnika				

L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
ZWALCZNIŁE CHWASTÓW						
L.p.	Substancja aktywna	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Uwagi dotyczące stosowania		
środki do stosowania przed wschodami chwastów						
1	pendimetalina	STOMP AQUA 455 CS	3,5 l	Stosować na przynajmniej rocznych lub starszych plantacjach, wczesną wiosną, w okresie spoczynku roślin uprawnych. Karencja- 80 dni.		
2	napropamid	DEVIRINOL 450 SC COLZAMID	plantacje nowo założone 3,0-4,0 l	Stosować wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji lub jesienią, po zbiorze owoców, w okresie wilgotnej i chłodnej pogody. Na plantacjach owocujących stosować do 15 października. Wykonywać tylko 1 zabieg w sezonie.		
			plantacje roczne i starsze 4,0-6,0 l			
środki do zwalczania chwastów po wschodach						
3	fluazyfop-P-butylowy	FUSILADE FORTE 150 EC TRIVKO PRIVUM 125 EC	0,6-1,0 l 0,75-1,0 l 0,75-1,0 l	Na chwasty prosozate od fazy 2-3 liści krzewienia. Okres karencji- 90 dni.		
4	fluazyfop-P-butylowy	FORTUNE	0,6-1,0 l			
5	cyklohesanodion	SELECT SUPER 120 EC GRAMIGUARD	0,8-1,0 l	Na chwasty prosozate od fazy 2-3 liści krzewienia. Okres karencji- 30 dni.		

nd - nie dotyczy

UWAGA :

Odpowiedzialność za skuteczność działania ⁽¹⁾ i fitotoksyczność ⁽²⁾ danego środka ochrony roślin stosowanego w wymienionej uprawie ponosi wyłącznie jego użytkownik !

(1) skuteczność działania : środki stosować zgodnie z przeznaczeniem po dokładnym zapoznaniu się z etykietą, dobierać właściwy środek, nie dopuszczać do przekraczania dawek, okresów karencji, nie opóźniać zabiegu, przechowywać środki ochrony roślin w szczelnie zamkniętych pojemnikach

(2) fitotoksyczność : niekorzystny wpływ "toksyczny" substancji na rośliny, np. przekraczanie dawek środków ochrony roślin w zabiegach agrotechnicznych, tj. pestycydów, herbicydów lub fungicydów

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją załączoną w etykiecie.

Chłodnia PREMIUM informuje, że we wrześniu **2022 roku** substancja czynna **indoksakarb** i oparte na nim preparaty tracią rejestrację i po tym terminie **NIE mogą być używane**.

Środki zawierające indoksakarb:

Indoxanin 300; Indoxanin 300-I; Rumo 30 WG; Steward 30 WG