

WYKAZ PROPONOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SEZONIE 2022

Podstawą opracowania powyższego niepełnego wykazu był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wg stanu na dzień 28.01.2022 r.

Rejestr wszystkich dopuszczonych i zarejestrowanych środków ochrony roślin jest zamieszczony na stronie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rabarbar- przed założeniem plantacji						
L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
1	zgnilizna szyjki korzeniowej; zgnilizna podstawy łodygi	HUWA-SAN TR50 (0,2%)	Utrzymać plantacje w czystości, bez chwastów, spulchaniać międzyrzędzia.Dezynfekcja karp, sadzonek rabarbaru środkiem Huwa-San TR50 i zaprawianie sproszkowanym węglem drzewnym ogranicza występowanie chorób. Plantacje zakładać z materiału kwalifikowanego wolnego od patogenów. Utrzymywać plantację wolną od chwastów oraz stosować odpowiednie nawożenie.			
Rabarbar- okres wzrostu i rozwoju roślin						
2	mszyca burakowa	AFIK	0,20%	nd	Lustracja roślin: około 20% roślin z koloniami mszyc. Największe zagrożenie występuje w lipcu, kiedy tworzą się kolonie na liściach sercowych.	polisacharydy
		EMULPAR' 940 EC	0,90%	nd		olej roślinny
		SILTAC EC	0,12-015%	nd		polimery silikonowe
3	gąsienice uszkadzające liście,	BIOBIT	0,5-1,0 kg	nd	Lustracja roślin: środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic wykonując 1-3 zabiegi na dane poloneie gąsienic.	środki bakteryjne
		DIPEL DF	0,5-1,0 kg	nd		
		FLORBAC	1,0 kg	nd		
		XEN TARI WG	1,0 kg	nd		
		XTREEM	1,0 kg	nd		
4	paciepnica ziemniaczana	BIOBIT	0,5-1,0 kg	1	Lustracja roślin: wykrycie pierwszych uszkodzeń na ogonkach liściowych. Największe zagrożenie ma miejsce w okresie wzrostu i wydłużania się ogonków liściowych.	środki bakteryjne
		DIPEL DF	0,5-1,0 kg	1		
		FLORBAC	1,0 kg	1		
		XEN TARI WG	1,0 kg	1		
		XTREEM	1,0 kg	1		
ZWALCZANIE CHWASTÓW						
L.p.	Substancja aktywna	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Uwagi dotyczące stosowania		
W TRAKCIE UPRAWY						
1	pendimetalina	STOMP AQUA 455 SC	3,5 l	Stosować wiosną, przed rozpoczęciem wegtacji. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i zalanych wodą. Najlepiej opryskiwać na glebę wilgotną, wolną od chwastów. Środek stosować raz w sezonie weगतacyjnym. Może powodować przemijające uszkodzenia , a także przejściowe zachamowanie wzrostu roślin, jednak nie mają one wpływu na plonowanie.		
WIOSNA, PO RUSZENIU WEGETACJI						
2	fluazyfop-P-butylowy	FUSILADE FORTE 150 EC	0,6- 1,25 l	Stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, w odpowiedniej fazie wzrostu chwastów jednoliściennych. Nie opryskiać w temp. Powyżej 27°C. Trivko w dawce 1,5 l/ha działa też na perz właściwy, ale słabiej. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tyg. Od zabiegu. Iwnensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środków, a chłodna pogoda i susza opóźniają działanie, ale nie obniżają skuteczności działania środków. rośliny jednoliscienne można uprawiać nie wcześniej niż po 2 miesiącach od zastosowania Fusilade Forte 150 EC w dawce 1,9- 2 l/ha i nie wcześniej niż po 2 tyg. , jeśli Fusilade Forte 150 EC użyto w dawce do 1 l/ha, a Trivko i Privium 125 EC dawce do 1,5 l/ha.		
PO ZAKOŃCZENIU ZBIORÓW						
3	fluazyfop-P-butylowy	TRIVKO PRIVUM 125 EC	0,75- 1,5 l	Karencja- 49 dni.		

nd - nie dotyczy

UWAGA :

Odpowiedzialność za skuteczność działania ⁽¹⁾ i fitotoksyczność ⁽²⁾ danego środka ochrony roślin stosowanego w wymienionej uprawie ponosi wyłącznie jego użytkownik !

(1) skuteczność działania : środki stosować zgodnie z przeznaczeniem po dokładnym zapoznaniu się z etykietą, dobierać właściwy środek, nie dopuszczać do przekraczania dawek, okresów karencji, nie opóźniać zabiegu, przechowywać środki ochrony roślin w szczelnie zamkniętych pojemnikach

(2) fitotoksyczność : niekorzystny wpływ "toksyczny" substancji na rośliny, np. przekraczanie dawek środków ochrony roślin w zabiegach agrotechnicznych, tj. pestycydów, herbicydów lub fungicydów

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.