

WYKAZ PROPONOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SEZONIE 2023

Podstawą opracowania powyższego niepełnego wykazu był rejestr środków ochrony roślin dopuszczalnych do obrotu i stosowania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wg stanu na dzień 28.02.2023 r.

Rejestr wszystkich dopuszczonych i zarejestrowanych środków ochrony roślin jest zamieszczony na stronie Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi.

Aronia - PRZED ZAŁOŻENIEM PLANTACJI						
L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
1	Przed założeniem plantacji sprawdzić obecność i liczebność pędraków i larw opuchlaków. Nie ma zarejestrowanych środków chemicznych do zwalczania larw szkodliwych chrząszczy żerujących w glebie.					
2	pędraki (larwy) chraboszcza majowego	Jeżeli są obecne zwalczać w maju lub w czerwcu, bądź w sierpniu z wykorzystaniem dostępnych metod: mechanicznej (np. uprawa gleby ostrymi narzędziami, wybieranie larw z gleby podczas orki), fitosanitarnej (uprawa gryki) i biologicznej (stosowanie środków zawierających nicianie entomopatogeniczne oraz grzyby owodobójcze)				
3	opuchlak truskawkowiec	Do zwalczania larw można stosować preparaty zawierające nicianie entomopatogeniczne, zgodnie za etykietą producenta.				
Aronia - PRZED KWITNIENIEM						
4	misecznik śliwowiec	TELDOR 770 EC	1,75%	nd	Środek stosować wczesną wiosną, na początku okresu wegetacji, w fazie pękania pąków.	olej parafinowy
5	mszyce	DECIS MEGA 50 EW*	0,25 l	nd	Zabieg wykonywać po pojawieniu się mszyc. *Stosować raz w sezonie jeden z nich. **Stosować raz w sezonie jeden z nich.	deltametryna
		DELTA 50 EW*	0,25 l	nd		deltametryna
		KARATE ZEON 050 CS**	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
		JUDO 050 CS**	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
		KUSTI 050 CS**	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
		NINJA 050 CS**	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
		SPRUZIT Koncentrat na Szkodniki EC	10,0 l	nd	substancje z grupy naturalnych	
		SILTAC EC	0,15 %	nd	Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc. Stosować zgodnie z etykietą produktu.	związki silikonowe
		NEXT PRO	0,1- 0,2 %	nd		związki silikonowe
EMULPAR' 940 EC	0,9-1,2 %	nd	olej z lnianki			
6	przędziorki	FITTER	10,0 l	nd	Dokładnie opryskiwać dolną stronę liści. Stosować zgodnie z etykietą produktu.	kwasy tłuszczowe
		NATURALIS	1,0-2,0 l	nd		beauveria bassiana
		SILTAC EC	0,15 %	nd		związki silikonowe
		NEXT PRO	0,1- 0,2 %	nd		związki silikonowe
		EMULPAR' 940 EC	0,9-1,2 %	nd		olej z lnianki
7	zwójka różoweczka	KARATE ZEON 050 CS*	0,15- 0,2 l	nd	Zwalczać w okresie wylęgania się gąsienic zimujących w złożach jaj (zazwyczaj koniec kwitnienia- początek maja). *Stosować raz w sezonie jeden z nich.	lambda-cyhalotryna
		JUDO 050 CS*	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
		KUSTI 050 CS*	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
		NINJA 050 CS**	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
8	omacnica jarzębianka	DECIS MEGA 50 EW*	0,25 l	nd	Zabieg wykonać wczesną wiosną- gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach i ewntualnie powtórzyć po kilku dniach. Decis Mega 50 EW stosować do końca kwitnienia. Przestrzegać prewencji. *Stosować raz w sezonie jeden z nich. **Stosować raz w sezonie jeden z nich.	deltametryna
		DELTA 50 EW*	0,25 l	nd		deltametryna
		KARATE ZEON 050 CS**	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
		JUDO 050 CS**	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
		KUSTI 050 CS**	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
		NINJA 050 CS**	0,15- 0,2 l	nd		lambda-cyhalotryna
9	mączliki	NATURALIS	0,75-1,0 l	nd	Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika w uprawie.	beauveria bassiana
10	wciornastki	NATURALIS	1,0-2,0 l	nd		beauveria bassiana
Aronia - PO KWITNIENIU						
11	przędziorki	MOVENTO 100 SC	0,75 l	14	Movento 100 SC stosować od początku rozwoju owoców do fazy zaawansowanego dojrzewania. Dokładnie opryskiwać dolną stronę liści. Stosować zgodnie z etykietą produktu.	spirotetramat
		SILTAC EC	0,15 %	nd		związki silikonowe
		NEXT PRO	0,1- 0,2 %	nd		związki silikonowe
		EMULPAR' 940 EC	0,9- 1,2 %	nd		olej z lnianki
12	mszyce	MOVENTO 100 SC	0,75 l	14	Zwalczać po pojawieniu się mszyc. Zabieg wykonywać w czerwcu lub lipcu ogranicza jednocześnie skośnika jarzębiaczka. Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.	spirotetramat
		SPRUZIT Koncentrat na Szkodniki EC	10,0 l	3		substancje z grupy naturalnych
		SILTAC EC	0,15 %	nd		związki silikonowe
		NEXT PRO	0,1- 0,2 %	nd		związki silikonowe
		EMULPAR' 940 EC	0,9- 1,2 %	nd		olej z lnianki
13	czerwce	MOVENTO 100 SC	0,75 l	14	Movento 100 SC stosować od początku rozwoju owoców do fazy zaawansowanego dojrzewania.	spirotetramat
14	muszka plamoskrzydła	DECIS EXPERT 100 EC	0,125 l	7	Zabieg wykonać po stwierdzeniu szkodnika w pułapkach. Opryskiwanie w tym terminie ogranicza jednocześnie skośnika jarzębiaczka. *Stosować jeden z nich.	deltametryna
		AFFIRM 095 SG/ PROCLAIM*	1,25-1,5 kg	7		benzoesan emamektyny

L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
15	<i>mączliki</i>	<i>NATURALIS</i>	0,75-1,0 l	nd	Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika w uprawie.	beauveria bassiana
16	<i>wciornastki</i>	<i>NATURALIS</i>	1,0-2,0 l	nd		beauveria bassiana
ZWALCZANIE CHWASTÓW						
L.p.	Substancja aktywna	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Uwagi dotyczące stosowania		
1	<i>glifosat</i>	<i>AGROSAR 360 SL; GLIFOCYD 360 SL; GLIFOHERB 360 SL; GLIFOPOL 360 SL; RESOLVA TOTAL</i>	3,0- 8,0 l	Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w okresie wegetacyjnym- 2. Karencja- 7 dni.		
		<i>GLIFOSIN 360 SL</i>	30,0 -80,0 ml/100 m ²	Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł. Karencja - 7 dni.		
2	<i>kletodym</i>	<i>GRAMIGUARD; SELECT SUPER 120 EC</i>	0,8- 2,0 l	Środek stosować przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców, w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym- 1. Karencja- 30 dni.		

nd - nie dotyczy

UWAGA :

Odpowiedzialność za skuteczność działania ⁽¹⁾ i fitotoksyczność ⁽²⁾ danego środka ochrony roślin stosowanego w wymienionej uprawie ponosi wyłącznie jego użytkownik !

(1) skuteczność działania : środki stosować zgodnie z przeznaczeniem po dokładnym zapoznaniu się z etykietą, dobierać właściwy środek, nie dopuszczać do przekraczania dawek, okresów karencji, nie opóźniać zabiegu, przechowywać środki ochrony roślin w szczelnie zamkniętych pojemnikach

(2) fitotoksyczność : niekorzystny wpływ "toksyczny" substancji na rośliny, np. przekraczanie dawek środków ochrony roślin w zabiegach agrotechnicznych, tj. pestycydów, herbicydów lub fungicydów

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.