

Stara Dąbia 44B
08-500 Ryki

WYKAZ PROPONOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SEZONIE 2023

Podstawą opracowania powyższego niepełnego wykazu był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wg stanu na dzień 28.02.2023 r.

Rejestr wszystkich dopuszczonych i zarejestrowanych środków ochrony roślin jest zamieszczony na stronie Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi.

Czereśnia - PRZED KWITNIENIEM						
L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
1	rak bakteryjny	MIEDZIAN EXTRA 350 SC/ 50 WP	1,3,0 l	7	Opryskiwać w fazie nabrzmiewania pąków. Fungicydy miedziowe ograniczają również występowanie brunatnej zgnilizny drzew pestkowych.	tlenochlorek miedzi
2	mszyce	KOBE 20 SP*	0,125 kg	14	Opryskiwać po zauważeniu mszyc. Mospilan 20 SP, Miros 20 SP, Lanmos 20 SP, Sekil 20 SP, Acelan 10 SP, Aceplan 20 SP Acetamoc, Kobe 20 SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,1 l/ha. *Stosować raz w sezonie jeden z nich. **Stosować raz w sezonie jeden z nich. ***Stosować raz w sezonie. ****Stosować jeden z nich.	acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		ACELAN 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC*	0,125 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		DECIS MEGA 50 EW**	0,15-0,25 l	7		deltametryna
		DELTA 50 EW**	0,15-0,25 l	7		deltametryna
		DEKA 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		DESHA 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		POLECI 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		MATRIX 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		DYNO 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		TREOL 770 EC***	1,50%	nd		olej parafinowy
		TYTER 50 WG****	0,14 kg	21		flonikamid
		AFINTO****	0,14 kg	21		flonikamid
3	zwójkówki liściowe i inne gąsienice zjadające liście	MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14	Jeżeli zachodzi konieczność, opryskiwać przed kwitnieniem. Preparaty można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha. Zabiegi preparatem Xen Tari WG, BioBit, DiPel DF, Florbac wykonywać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic, stosować raz w sezonie. *Stosować jeden z nich.	acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC*	0,2 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		XEN TARI WG	0,5-1,5 kg	nd		bacillus thuringiensis
		BIOBIT	0,75-1,5 kg	nd		bacillus thuringiensis
		DIPEL DF	0,75-1,5 kg	nd		bacillus thuringiensis
		FLORBAC	0,5-1,5 kg	nd		bacillus thuringiensis
		XTREEM	0,5-1,5 kg	nd		bacillus thuringiensis
		Czereśnia - KWITNIENIE				
4	rak bakteryjny	MIEDZIAN EXTRA 350 SC/ 50 WP	1,5 l/kg	7	Opryskiwać tylko odmiany podatne zwłaszcza w okresie opadów.	miedź/tlenochlorek
		SERENADE ASO*	8,0 l	nd	*Środek ogranicza stosowanie choroby	bacillus subtilis
5	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	SERENADE ASO**	8,0 l	nd	Zabiegi w okresie kwitnienia są konieczne tylko w sadach, w których w poprzednich latach choroba występowała na kwiatach i pędach. *Fungicydy IBE stosować w temp. Powyżej 12°C i nie częściej niż 1-2 razy w sezonie. Jeden ze środków benzimidazolowych oraz Luna Experience 400SC stosować tylko raz w sezonie.	bacillus subtilis
		SIGNUM/ SPECTOR/ SINGAPUR 33 WG	0,75 kg	7		piraklostrobina + boskalid
		LUNA EXPIRENCE 400 SC*	0,6 l	7		fluopyram + tebukonazol
		SWITCH 62,5 WG i odpowiedniki	0,6-1,0 kg	7		cyprodynil + fludioksonil
Czereśnia - PO KWITNIENIU						
6	drobna plamistość drzew pestkowych	SYLLIT/ EFUZIN 544 SC	1,25 l	14	Pierwsze opryskiwanie wykonać bezpośrednio po kwitnieniu, następne 2-3 zabiegi co 10-14 dni. *Fungicydy IBE stosować w temp. Powyżej 120C i nie częściej niż 1-2 razy w sezonie. Jeden ze środków benzimidazolowych oraz Luna Experience 400SC stosować tylko raz w sezonie.	dodyna
		DODIFUN SC	1,7 l	14		dodyna
		BLUNA/ FERTEN/ HAJMON/ TORES/ VALOR/ WEZEN 250 EC	0,2 l	28		difenokonazol
		LUNA EXPIRENCE 400 SC*	0,6 l	7		fluopyram + tebukonazol
		BISZOP/ ELCAPPO/ KAPELAN/ KAPLAN/ PASTOR 80 WG	1,9 kg	14		kaptan
		MERPAN/ MERINO 80 WDG	1,9 l	21		kaptan

7	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	SIGNUM/ SPECTOR/ SINGAPUR 33 WG	0,75 kg	7	W celu ochrony owoców zabiegi należy rozpocząć ok. 3 tygodnie po kwitnieniu, w czasie opadnięcia z zawiązków resztek okwiatu. W latach z dużą ilością opadów szczególnie istotne są zabiegi w okresie wzrostu i wybarwiania się owoców. Jeden ze środków benzimidazolowych oraz Luna Experience 400 SC stosować tylko raz w sezonie, Switch 62,5 WG i jego odpowiedniki - 2 razy, a Signum 33 WG i jego odpowiedniki - 3 razy w sezonie. *Środek ogranicza występowanie choroby.	piraklostrobina + boskalid
		SWITCH 62,5 WG i odpowiedniki	0,6-1,0 kg	7		cyprodynil + fludioksonil
		LUNA EXPIRENCE 400 SC	0,6 l	7		fluopyram + tebukonazol
		SERENADE ASO *	8,0 l	nd		bacillus subtilis
8	dziurkowatość liści drzew pestkowych	LUNA EXPIRENCE 400 SC	0,6 l	7	Wymienione środki stosować tylko raz w sezonie.	fluopyram + tebukonazol
9	szara pleśń	LUNA EXPERIENCE 400 SC	0,6 l	7	Luna Experience 400 SC stosować tylko raz w sezonie. *Środek ogranicza występowanie choroby.	fluopyram + tebukonazol
		POLYVERSUM WP*	0,15 kg	nd		pythium oligandrum
10	kwiecień pestkowych	ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14	W zagrożonych sadach opryskiwać tuż po kwitnieniu. *Stosować raz w sezonie jeden z nich.	acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
11	przędziorek chmielowiec i inne gatunki przędziorków oraz szpeciele	KANEMITE 150 SC	1,8 l	21	Stosować od końca fazy kwitnienia do wybarwienia owoców, po przekroczeniu progu zagrożenia.	acekwinocyl
		EMULPAR 940 EC	0,9-1,2 %	nd		olej rydzowy i środki emulgujące
		SILTAC EC	0,1-0,2 %	nd		polimeryczne związki silikonowe
12	nasionnica trześniówka	LOS OVADOS 200 SE	0,125 kg	14	W połowie maja zawiesić żółte pułapki lepowe i rejestrować przebieg lotu much. Zabieg wykonać po 5-7 dniach regularnego odłowu much na pułapki. Kolejne opryskiwania (1 lub 2) przeprowadzić w zależności od przebiegu lotu. Opryskiwać tylko średnio lub późno dojrzewające odmiany wiśni, ściśle przestrzegając karencji. *Stosować raz w sezonie jeden z nich. **Stosować raz w sezonie jeden z nich.	acetamipryd
		KOBE 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		ACELAN 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC*	0,125 kg	14		acetamipryd
		DECIS MEGA 50 EW**	0,25 l	7		deltametryna
		DEKA 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		DESHA 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
13	zwójka siatoweczka	EXIREL 100 SE	0,5 ml	7	Dyspensery rozwiesić przed pojawieniem się pierwszych motyli, nie wcześniej niż tydzień przed ich spodziewaniem się. Stosować raz w sezonie.	cyjanotraniliprol
		RAK 3+4	500 dyspenserów/ha	nd		alkohol alifatyczny
14	mszyce	ACCEPTIR 200 SE	0,125 l	14	Los Ovados 200 SE, Aceptir 200 SE, Apis 200 SE, Mospilan 20 SP, Miros 20 SP, Lanmos 20 SP, Sekil 20 SP, Acelan 20 SP, Aceplan. 20 SP, Acetamoc, Kobe 20 SP można stosować z adiuwantem Slippa w dawce 0,1 l/ha. Unikać stosowania pyretroidów w tym okresie. Preparaty Tyter 50 WG, Afinto zarejestrowane są do zwalczania mszycy na wiśni. *Stosować raz w sezonie jeden z nich. **Stosować raz w sezonie jeden z nich. ***Stosować jeden z nich.	acetamipryd
		APIS 200 SE	0,125 l	14		acetamipryd
		LOS OVADOS 200 SE	0,125 l	14		acetamipryd
		ACELAN 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC*	0,125 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,125 kg	14		acetamipryd
		DECIS MEGA 50 EW**	0,15-0,25 l	7		deltametryna
		DEKA 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		DESHA 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		POLECI 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		MATRIX 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		DYNO 2,5 EC**	0,3 l	45		deltametryna
		TYTER 50 WG****	0,14 kg	21		flonikamid
		AFINTO****	0,14 kg	21		flonikamid

15	śluzownica ciemna	MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14	*Stosować raz w sezonie jeden z nich.	acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC*	0,2 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
16	muszka plamoskrzydła	MATRIX 2,5 EC*	0,3 l	45	Zabieg wykonywać przed zbiorem po 3-4 dniach od stwierdzenia szkodnika w pułapkach. W przypadku preparatów, które mają 7 dni karencji, zabieg powtórzyć pomiędzy zbiorami. *Stosować raz w sezonie jeden z nich.	deltametryna
		DYNO 2,5 EC*	0,3 l	45		deltametryna
		DECIS MEGA 50 EW*	0,25 l	7		deltametryna
		DEKA 2,5 EC*	0,3 l	45		deltametryna
		DESHA 2,5 EC*	0,3 l	45		deltametryna
		POLECI 2,5 EC*	0,3 l	45		deltametryna
Czereśnia - PO ZBIORZE						
17	drobna plamistość liści drzew pestkowych	SYLLIT/ EFUZIN 544 SC	1,25 l	nd	Opryskiwać w lata z dużą ilością opadów, gdy porażonych jest ponad 10 % liści.Środki zawierające dodynę stosować max - 2 razy.	dodyna
		DODIFUN SC	1,7 l	nd		dodyna
18	rak bakteryjny, srebrzystość liści	Aktualnie brak zarejestrowanych środków do zwalczania choroby w tym terminie.			Cięcie drzew wykonywać po zbiorze owoców w suchy i słoneczny dzień. Usuwać porażone pędy i gałęzie, dezynfekować narzędzia do cięcia. Gałęzie lub drzewa wykazujące objawy srebrzenia ciąć oddzielnie. Zabezpieczać rany po cięciu przez zamaľowanie białą farbą emulsyjną z dodatkiem 1% środka miedziowego.	
19	przędziorki oraz szpeciele	SILTAC EC	0,15%	nd	Stosować zgodnie z etykietami.	polimeryczne związki
		EMULPAR 940 EC	0,9-1,2%	nd		owej rydzowy i środki
Czereśnia - PODCZAS OPADANIA LIŚCI						
20	rak bakteryjny	Aktualnie brak zarejestrowanych środków do zwalczania choroby w tym okresie.				
ZWALCZNIŁE CHWASTÓW						
L.p.	Substancja aktywna	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Uwagi dotyczące stosowania		
środki do stosowania przed wschodami chwastów						
1	pendimetalina	STOMP AQUA 455 SC	3,5 l	Zabieg wykonywać jesienią, przed wschodami chwastów.		
środki do zwalczania chwastów po wschodach						
2	pochodne glicyny	AGROSAR/ GLIFOCYD 360 SL	3,0-8,0 l	Karencja- 7 dni.		
3	glifosat + MCPA	ORKAN 350 SL, SPRINTER 350 SL,	5-8 l	Środki wykorzystywać do niszczenia dwulisciennych chwastów trwałych. Opryskiwać w okresie intensywnego wzrostu chwastów, do początku kwitnienia lub po kwitnieniu. Wykonywać max 1zabieg w sezoie wegetacyjnym.		

nd - nie dotyczy

UWAGA :

Odpowiedzialność za skuteczność działania ⁽¹⁾ i fitoksyčność ⁽²⁾ danego środka ochrony roślin stosowanego w wymienionej uprawie ponosi wyłącznie jego

przekraczania dawek , okresów karencji, nie opóźniać zabiegu, przechowywać środki ochrony roślin w szczelnie zamkniętych pojemnikach tj. pestycydów, herbicydów lub fungicydów

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zaieszczoną w etykiecie.

Chłodnia PREMIUM informuje, że 2023 roku upływa termin zużycia zapasów następujących środków oraz **NIE wolno ich stosować po określonym terminie.**

MERTOP 80 WDG (31.01.2023)

KOSAMEKTYN II 018 EC (30.11.2023)