

WYKAZ PROPONOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SEZONIE 2023

Podstawą opracowania powyższego niepełnego wykazu był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wg stanu na dzień 28.02.2023 r.

Rejestr wszystkich dopuszczonych i zarejestrowanych środków ochrony roślin jest zamieszczony na stronie Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi.

Papryka - PRZED SIEWEM						
L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
1	patogeny glebowe	BASAMID	500 kg /ha	nd	Jesienią odkażanie termiczne ziemi. Basamid stosować od końca sierpnia do połowy października lub wiosną od końca marca do połowy kwietnia gdy zakres temp. w górnej warstwie gleby wynosi 6-27 ⁰ C.	dazomet
2	zgorzel siwek, chorobotwórcze grzyby glebowe	Brak środków do zaprawiania nasion papryki.				
3	zgnilizna twardzikowa	CONTANS WG	0,8 g/m ² ; 8 kg/ha	nd	Stosować 10-30 dni przed planowanym siewem lub sadzeniem.	coniothyrium minitans
Papryka - OCHRONA ROZSADY						
4	patogeny odglebowe	Para wodna, temperatura ziemi 80-90 ⁰ C przez 20 minut			Jesienią odkażać termicznie ziemię lub substraty do podukcji rozsady. Użytkować podłoże bezpośrednio po ostygnięciu podłoża - do 3 dni po zabiegu lub miesiąc po zabiegu.	bakterie glebowe
Papryka - OKRES WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN						
5	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	POLYVERSUM WP	0,15 kg	nd	Serenade ASO stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Polyversum WP stosować od fazy gdy pierwsze owoce osiągną 5-6 cm.	pythium oligandrum
		SERENADE ASO	8,0 l	nd		bacillus subtilis
6	antraknoza	SERENADE ASO	8,0 l	nd	Środki stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Scorpion 325 SC Ortiva Top 325 SC i Tarantula 325 SC zarejestrowane również do zwalczania brunatnej plamistości liści i mączniakowi prawdziwemu.	bacillus subtilis
		TARANTULA 325 SC	1,0 l	3		azoksystrobina + difenokonazol
		SCORPION 325 SC	1,0 l	3		
		ORTIVA TOP 325 SC	1,0 l	3		
		NORDOX 75 WG	1,33 kg	10		miedź
7	mączniak prawdziwy	ARMICARB SP	3,0 kg	nd	Armicarb SP i Karbicare SP stosować zapobiegawczo, od fazy rozwoju liści do pełnej dojrzałości owocu, gdy owoce mają typową barwę. Pozostałe środki stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie.	wodorowęglan potasu
		KARBICURE SP	3,0 kg	nd		wodorowęglan potasu
		FLOSUL	3,0 l	3		siarka
		SCORPION 325 SC	1,0 l	3		azoksystrobina + difenokonazol
		ORTIVA TOP 325 SC	1,0 l	3		
		TARANTULA 325 SC	1,0 l	3		
		DISCUS 500 WG	0,5 kg	3		krezoksym matylu
8	antraknoza, fytoftoroza i inne choroby grzybowe	NORDOX 75 WG	1,33 kg	10	Stosować od fazy rozwiniętych 5 liści właściwych do fazy początku dojrzewania owoców.	tlenek miedzi
9	przędziorek chmielowiec	AFIK	0,20%	nd	Lustracja roślin: stwierdzenie 10% roślin z objawami żerowania szkodnika. Stosować po przekroczeniu grogu zagrożenia.	polisacharydy
		EMULPAR 940 EC	1,20%	nd		olej z lnianki
		SILTAC EC	0,05-0,07%	nd		związki silikonowe

L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
10	<i>wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni</i>	<i>ACELAN 20 SP + SLIPPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14	Lustracja roślin: wykrycie pojedynczych larw i osobników dorosłych na 10 kolejnych roślinach. Stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy 40 % owoców uzyskuje typową barwę. Rośliny opryskiwać nie więcej niż 3 razy w sezonie co 7-10 dni.	acetamipryd
		<i>ACEPLAN 20 SP + SLIPPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14		acetamipryd
		<i>ACETAMOC + SLIPPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14		acetamipryd
		<i>KOBE 20 SP + SLIPPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14		acetamipryd
		<i>LANMOS 20 SP + SLIPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14		acetamipryd
		<i>MOSPILAN 20 SP + SLIPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14		acetamipryd
		<i>SEKIL 20 SP + SLIPPA</i>	0,2 kg + 0,2 l	14		acetamipryd
		<i>EMULPAR 940 EC</i>	0,9-1,2%	nd		olej z lnianki
		<i>SILTAC EC</i>	0,15-0,2%	nd		związki silikonowe
11	<i>zmienik lucernowiec; mszyce</i>	<i>ACELAN 20 SP</i>	0,2 kg	14	Lustracja roślin: wykrycie 2 osobników na 1 m ² uprawy, w 8-10 kolejnych roślinach. Stosować jeden z nich, raz w sezonie od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy owoce osiągają typową barwę, nie więcej niż jeden zabieg w sezonie.	acetamipryd
		<i>ACEPLAN 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>ACETAMOC</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>KOBE 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>LANMOS 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>MOSPILAN 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>SEKIL 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
12	<i>mszyce</i>	<i>ACELAN 20 SP</i>	0,2 kg	14	Lustracja roślin: stwierdzenie pojedynczych koloni mszyc na 10% roślin. Stosować jeden z nich, nie więcej niż 2 razy w sezonie co 10-14 dni. Stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego liścia do końca fazy, gdy 10% owoców uzyska typową barwę.	acetamipryd
		<i>ACEPLAN 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>ACETAMIP 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>ACETAMOC</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>KOBE 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>LANMOS 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>MAKARI 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>MARABEL 20 SP</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>EMULPAR 940 EC</i>	0,90%	nd		olej z lnianki
		<i>SILTAC EC</i>	0,05-0,07%	nd		związki silikonowe
13	<i>piętnówka kapustnica</i>	<i>LEPINOX PLUS</i>	1,0 kg	1	Lustracja roślin: wykrycie 4-5 gąsiennic na 50 kolejnych roślinach. Stosować w okresie wylęgania się gąsiennic. Max wykonać 3 zabiegi nie częściej, niż co 7 dni.	bacillus thuringensis
		<i>FLORBAC</i>	1,0 kg	1		bacillus thuringensis
		<i>XEN TARI WG</i>	1,0 kg	1		bacillus thuringensis
		<i>XTREEM</i>	1,0 kg	1		bacillus thuringensis
14	<i>słonecznica orzęzówka</i>	<i>AFFIRM 095 SG</i>	1,5 kg	3	Zabiegi wykonywać wg sygnalizacji nie częściej niż 3 razy w sezonie i nie częściej niż co 7 dni.	acetamipryd
		<i>XEN TARI WG</i>	1 kg	1		bacillus thuringensis
		<i>XTREEM</i>	1 kg	1		bacillus thuringensis
15	<i>rolnice</i>	<i>AFFIRM 095 SG</i>	1,5 kg	3	Stosować do 2 razy w sezonie i nie częściej, niż co 7 dni.	acetamipryd
ZWALCZANIE CHWASTÓW						
Obecnie brak jest zarejestrowanych środków do zwalczania chwastów w uprawie papryki, dlatego też plantacje tej rośliny należy zakładać na polach utrzymanych w dobrej kulturze, o niewielkim zachwaszczeniu. Chwasty należy usuwać mechanicznie lub ręcznie.						

n.w. - nie wymagane

nd - nie dotyczy

** - Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania

UWAGA :

Opowiedzialność za skuteczność działania ⁽¹⁾ i fitoksyczość ⁽²⁾ danego środka ochrony roślin stosowanego w wymienionej uprawie ponosi wyłącznie jego użytkownik !

(1) skuteczność działania : środki stosować zgodnie z przeznaczeniem po dokładnym zapoznaniu się z etykietą, dobierać właściwy środek, nie dopuszczać do przekraczania dawek , okresów karencji, nie opóźniać zabiegu, przechowywać środki ochrony roślin w szczelnie zamkniętych pojemnikach

(2) fitoksyczość : niekorzystny wpływ "toksyczny" substancji na rośliny, np. przekraczanie dawek środków ochrony roślin w zabiegach agrotechnicznych, tj. pestycydów, herbicydów lub fungicydów

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zaieszczoną w etykiecie.