

WYKAZ PROPONOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SEZONIE 2023

Podstawą opracowania powyższego niepełnego wykazu był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wg stanu na dzień 28.02.2023 r.

Rejestr wszystkich dopuszczonych i zarejestrowanych środków ochrony roślin jest zamieszczony na stronie Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi.

Porzeczka czarna - PRZED KWITNIENIEM							
L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna	
1	amerykański mączniak agrestu	podczas wiosennych lustracji i cięcia, usuwać pędy z objawami porażenia					
		SIARKOL 80 WP/ 80 WG/ EXTRA 80 WP/ BIS 80 WG/ 800 SC	3,0-5,0 kg	7	Stosować tylko podatne odmiany, zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów. Fungicydy siarkowe, Topas/ Penkona 100 EC stosować max 2 razy. Discus 500 WG i Nimrod 250 EC - 3 razy, środki benzimidazolowe - 1 raz w sezonie. Topas/ Penkona 100 EC stosować w temperaturze powyżej 12°C. *Środki ograniczają występowanie choroby.	siarka	
		NIMROD 250 EC	0,75-1,5 l	14		bupirymat	
		DISCUS 500 WG	0,2 kg	21		krezoksym metylu	
		TOPAS/ PENKONA 100 EC	0,5 l	20		penkonazol	
		ARMICARB/ KARBICURE SP*	5,0 kg	1		wodorowęglan potasu	
LIMOCIDE/ PREV-AM/ PESTICOL*	2,4 l	14	olejek pomarańczowy				
2	antraknoza (opadżina) liści porzeczki, bała plamistość liści	SIGNUM/ SPECTOR/ SINGAPUR 33 WG	1,8 kg	3	Opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem. Fungicydy z poszczególnych grup stosować przemienne. Jeden ze środków benzimidazolowych - 1 raz, a Signum 33 WG i odpowiedniki oraz Zato 50 WG do 2 razy w sezonie.	piraklostrobina + boskalid	
		ZATO 50 WG	0,2 kg	14		trifloksystrobina	
		SWITCH 62,5 WG i ODPOWIEDNIKI	0,8-1,0 kg	7		cyprodynil + fludioksnil	
		MIEDZIAN 50 WP/ MIEDZIAN EXTRA 350 SC	3,0 kg	7		miedź	
3	zamieranie pędów	SWITCH 62,5 WG i ODPOWIEDNIKI	0,8-1,0 kg	7	Zabiegi rozpocząć gdy nowe pędy osiągną długość 10-20 cm, następnie podczas kwitnienia. Środek stosować maksymalnie 3 razy w sezonie.	cyprodynil + fludioksnil	
4	wielkopąkowiec porzeczkowy	SIARKOL EXTRA 80 WP stosowany do zwalczania amerykańskiego mączniaka agrestu będzie jednocześnie ograniczał wielkopąkowca porzeczkowego. Stosować w okresie pękania pąków (około trzy tygodnie przed kwitnieniem).					
5	krzywik porzeczkwiaček	ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14	Opryskiwanie wskazane tylko na zagrożonych plantacjach, głównie uszkodzonych w poprzednim roku. Wykonać je w czasie pękania pąków liściowych, zwykle w marcu lub na początku kwietnia. Lokalnie na plantacjach silnie uszkodzonych w poprzednim roku, mogą być potrzebne nawet 2-3 zabiegi w okresie rozwoju pąków. *Stosować jeden z nich.	acetamipryd	
		ACEPLAN 20 SP	0,2 kg	14		acetamipryd	
		ACETAMOC*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14	acetamipryd				
6	mszyca porzeczkowo-czysciecowa i inne gatunki mszyc	ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14	Mszyca porzeczkowo-czysciecowa powoduje zniekształcenia i przebarwienie liści na kolor żółto-czerwony. Zastosowane preparaty do zwalczania mszyc mszyc tuż przed kwitnieniem ograniczają jednocześnie przyszcarka porzeczkwiačka kwiatowego. *Stosować jeden z nich raz w sezonie. **Stosować raz w sezonie jeden z nich.	acetamipryd	
		ACEPLAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		ACETAMOC*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		DELTA 50 EW**	0,25 l	7		deltametryna	
DECIS MEGA 50 EW**	0,25 l	7	deltametryna				
7	przyszczonek porzeczkwiaček kwiatowy	Brak dostępnych środków do zwalczania tego szkodnika			Zwalczanie konieczne na plantacjach, na których odnotowano uszkodzenia w poprzednim sezonie.		
8	szkodniki żadające liście: plamiec agrestiaček, przyszczonek porzeczkwiaček liściowy, zwójkówki liściowe	ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14	Zabieg potrzebny w razie liczego pojawienia się szkodników, po zauważeniu pierwszych uszkodzeń liści. Preparaty Acelan 20 SP, Aceplan 20 SP, Acetamoc, Kobe 20 SP, Mospilan 20 SP, Miros 20SP, Lamnos 20 SP, Sekil 20 SP, ograniczają jednocześnie mszyce. Spin Tor 240 SC zwalcza tylko gąsienice zwójkówek. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dla pszczół. Preparaty zawierające acetamipryd można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha *Stosować jeden z nich. **Stosować jeden z nich. ***Stosować jeden z nich.	acetamipryd	
		ACEPLAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		ACETAMOC*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd	
		SPIN TOR 240 SC	0,32-0,4 l	3		acetamipryd	
		XEN TARI WG***	1,0-1,2 kg	nd		spinosad	
		BIOBIT***	0,5-1,0 kg	1		bacillus thuringiensis	
		DIPEL DF***	0,5-1,0 kg	1		bacillus thuringiensis	
		FLORBAC***	1,0-1,2 kg	1		bacillus thuringiensis	
		XTREEM***	1,0-1,2 kg	1		bacillus thuringiensis	
SPRUZIT Koncentrat na szkodniki EC	10,0 l	3	substacja z grupy naturalnych				

L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
9	przędziorek chmielowiec	KOROMITE 10 EC*	1,25 l	nd	Limocide, Prev-AM, Pesticol stosować do końca fazy rozwoju kwiatostanu. *Stosować jeden z nich. **Stosować jeden z nich.	milbemektyna
		MILBEKNOCK 10 EC*	1,25 l	nd		milbemektyna
		ORTUS 05 SC	1,5 l	21		fenpiroksymat
		LIMOCIDE**	2 l	14		olejek pomarańczowy
		PREV-AM**	2, 0 l	1		olejek pomarańczowy
		PESTICOL **	2,0 l	1		olejek pomarańczowy
10	zwójka różoweczka	SPIN TOR 240 SC*	0,32-0,4 l	3	Opryskiwać w okresie wylęgania się gąsienic, tuż przed kwitnieniem, na plantacjach, gdzie stwierdzono zimujące jaja zwójki różoweczki. Preparaty zawierające acetamipryd można stosować łącznie z adiuwentem Slippa w dawce 0,2 l/ha.	spinosad
		MAX SPIN *	0,32-0,4 l	nd		spinosad
		ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP *	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC *	0,2 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		DECIS MEGA 50 EW***	0,25 l	7		deltametryna
		DELTA 50 EW***	0,25 l	7		deltametryna
11	skoczki	LIMOCIDE*	2,4 l	14	Stosować od fazy, gdy pędy osiągają 90% typowej długości do końca fazy rozwoju kwiatostanu. *Stosować jeden z nich.	olejek pomarańczowy
		PREV-AM*	2,4 l	1		olejek pomarańczowy
		PESTICOL *	2,4 l	1		olejek pomarańczowy
Porzeczka czarna - KWITNIENIE						
12	rewersja porzeczki czarnej	Dokładna lustracja plantacji i usuwanie porażonych krzewów. Zwalczanie wielkopąkówca ogranicza rozprzestrzenianie się rewersji.				
13	szara pleśń	BISZOP/ ELCAPPO/ KAPELAN/ KAPLAN/ PASTOR 80 WG	1,9 kg	7	Stosować od początku kwitnienia. Switch 62,5 WG i odpowiedniki oraz Teldor 500 SC maksymalnie 3 razy w sezonie, Luna Sensation/ Largus Extra 500 SC - 2 razy, *Środki ograniczają występowanie choroby.	kaptan
		SERENADE ASO*	8,0 l	nd		kaptan
		BOTECTOR*	1,0 kg	1		aureobasidium pullulans
		POLYVERSUM WP*	0,15 kg	nd		kaptan
		LUNA SENSATION/ LARGUS EXTRA 500 SC	0,6-0,8 l	7		fluopyram + trifloksystrobina
		SWITCH 62,5 WG i ODPOWIEDNIKI	0,8-1,0 kg	7		cyprodynil + fludioksonil
		TELDOR 500 SC	1,5 l	5		fenpiroksymat
		SCALA	2,0 l	3		pirymetanol
14	owocnica porzeczki	ACELAN 20 SP*	0,2 kg	14	Zabieg potrzebny tylko lokalnie na plantacjach zasiedlonych i uszkodzonych w poprzednim roku. Opryskiwać na początku pełni kwitnienia i powtórzyć po pełni kwitnienia porzeczki. Do rejestracji przebiegu lotu owocnicy można wykorzystać żółte tablice lepowe. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa pszczół. *Stosować jeden z nich.	acetamipryd
		ACEPLAN 20 SP *	0,2 kg	14		acetamipryd
		ACETAMOC *	0,2 kg	14		acetamipryd
		KOBE 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		MIROS 20 SP**	0,2 kg	14		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	14		acetamipryd
		SPRUZIT Koncentrat na szkodniki EC	10,0 l	3		substancja z grupy naturalnych
15	wielkopąkowiec porzeczki	ORTUS 05 SC	1,5 l	21	Preparaty stosować od początku do pełni kwitnienia. Preparaty można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,1 l/ha Siltac EC i Nex Pro stosować w okresie migracji szkodnika do fazy bezpośrednio po kwitnieniu.	fenpiroksymat
		SILTAC EC	0,10%	nd		związki silikonowe
		NEX PRO	0,1-0,2%	nd		związki silikonowe
16	wciornastek różówek	SPIN TOR 240 SC*	0,32-0,4 l	3	Na zagrożonych uprawach stosować od początku do pełni kwitnienia. *Stosować jeden z nich.	spinosad
		MAX SPIN *	0,32-0,4 l	nd		spinosad
Porzeczka czarna - PO KWITNIENIU						
17	antraknoza (opadźlina) liści porzeczki, rdza wejnutowo-porzeczki	MIEDZIAN 50 WP/ MIEDZIAN EXTRA 350 SC	3 l	7	Pierwsze opryskiwanie wykonać bezpośrednio po kwitnieniu, dalsze przeciętnie, co 10-14 dni. Zabiegi przeciwko rdzy wejnutowo-porzeczkiowej rozpocząć w połowie czerwca.	miedź/ tlenochlorek miedzi
		SIGNUM/SPECTOR/ SINGAPUR 33 WG	1,8 kg	3		piraklostrobina + boskalid
		ZATO 50 WG	0,2 kg	14		trifloksystrobina
		LUNA SENSATION/ LARGUS EXTRA 500 SC	0,6-0,8 l	7		fluopyram + trifloksystrobina
		SWITCH 62,5 WG i ODPOWIEDNIKI	0,8-1 kg	7		cyprodynil + fludioksonil

L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
18	<i>amerykański mączniak agrestu</i>	<i>NIMROD 250 EC</i>	0,75-1,5 l	14	Pierwsze opryskiwanie wykonać około 2 tygodnie po kwitnieniu, dalsze przeciętnie, co 10 dni tylko na odmianach podatnych. Wyższe z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby. Fungicydy siarkowe, Luna Sensation/ Largus Extra 500 SC, Zato 50 WG, oraz Topas/ Penkona 100 EC stosować maksymalnie -2 razy, Discus 500 WG i Nimrod 250 EC- 3 razy, jeden ze środków benzimidazolowych raz w sezonie. *Środki ograniczają występowanie choroby.	bupirymat
		<i>ZATO 50 WG</i>	0,2 kg	14		trifloksystrobina
		<i>DISCUS/ DIOMEDES 500 WG</i>	0,2 kg	21		krezoksym metylu
		<i>TOPAS/ PEKONA 100 EC</i>	0,5 l	20		penkonazol
		<i>SIARKOL 80 WP/ 80 WG/ EXTRA 80 WP/ BIS 80 WG/ 800 SC</i>	3-5 kg	7		siarka
		<i>LUNA SENSATION/ LARGUS EXTRA 500 SC</i>	0,6-0,8 l	7		fluopyram + trifloksystrobina
		<i>ARMICARB/ KARBICURE SP *</i>	5 kg	nd		wodroweglam potasu
		<i>SERENADE ASO*</i>	8,0 l	nd		bacillus subtilis
		<i>LIMOCIDE/ PREV-AM/ PESTICOL*</i>	2,4 l	1		olejek pomarańczowy
19	<i>szara pleśń</i>	<i>SWITCH 62,5 WG i ODPOWIEDNIKI</i>	0,8-1 kg	7	Switch 62,5 WG i odpowiedniki, Teldor 500 SC stosować max - 3 razy, a Luna Sensation/ Largus Extra 500 SC oraz Scala- 2 razy w sezonie. *Środki ograniczają występowanie choroby.	cyprodynil + fludioksonil
		<i>TELDOR 500 SC</i>	1,5 l	5		fenpiroksymat
		<i>SCALA</i>	2,0 l	3		pirymetanol
		<i>LUNA SENSATION/ LARGUS EXTRA 500 SC</i>	0,6-0,8 l	7		fluopyram + trifloksystrobina
		<i>BISZOP/ EL CAPPO/ KAPELAN/ KAPLAN/ PASTOR 80 WG</i>	1,9 kg	7		kaptan
		<i>POLYVERSUM WP*</i>	0,15 kg	nd		pythium oligandrum
		<i>SERENADE ASO*</i>	8,0 l	nd		bacillus subtilis
		<i>BOTECTOR*</i>	1,0 kg	1		aureobasidium pullulans
20	<i>wielkopąkowiec porzeczkowy</i>	<i>MOVENTO 100 SC</i>	0,75 l	14	Stosować po kwitnieniu, od początku rozwoju owoców do fazy zaawansowanego dojrzewania.	spinosad
21	<i>szkodniki zjadające liście (brzoźczak porzeczkowy, pilecznica agrestowa, zwójkówki)</i>	<i>XEN TARI WG**</i>	1,0-1,2 kg	1	Szkodniki te są ograniczane podczas zwalczania mszyc. Preparaty XenTargi WG BioBit, DiPel DF, Florbac i Xtream zarejestrowane są do zwalczania gąsienic uszkadzających liście. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic. Spruzit Koncentrat na Szkodniki EC zwalcza stadia larwalne szkodników gryzących. **Stosować jeden z nich.	bacillus thuringiensis
		<i>BIOBIT**</i>	0,5-1,0	1		bacillus thuringiensis
		<i>DIPEL DF**</i>	0,5-1,2	1		bacillus thuringiensis
		<i>FLORBAC**</i>	1,0-1,2	1		bacillus thuringiensis
		<i>XTREEM**</i>	1,0-1,2	1		bacillus thuringiensis
		<i>SPRUZIT Koncentrat na szkodniki EC</i>	10,0 l	3		substancja z grupy naturalnych
22	<i>mszyce</i>	<i>MOVENTO 100 SC</i>	0,75 l	14	Zabieg wykonać po zauważeniu mszyc, zwykle tuż po kwitnieniu. Preparaty zwalczają jednocześnie inne szkodniki. Przestrzegać okresu karencji. *Stosować raz w sezonie jeden z nich.	spinosad
		<i>SPRUZIT Koncentrat na szkodniki EC</i>	10,0 l	3		substancja z grupy naturalnych
		<i>DECIS MEGA 50 EW*</i>	0,25 l	7		deltametryna
		<i>DELTA 50 EW*</i>	0,25 l	7		deltametryna
23	<i>pryszczonek porzeczkowiec pędowy, pryszczonek porzeczkowiak liściowy</i>	<i>MOVENTO 100 SC</i>	0,75 l	14	Zabieg wykonać po zauważeniu larw pryszczonek, najczęściej tuż po kwitnieniu i powtórzyć po 10-14 dniach. Preparaty zwalczają również obecne na krzewach motyle przeziernika porzeczkowca. *Stosować jeden z nich.	spinosad
		<i>MOSPILAN 20 SP*</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>MIROS 20 SP*</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>LANMOS 20 SP*</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
		<i>SEKIL 20 SP*</i>	0,2 kg	14		acetamipryd
24	<i>przędziorek chmielowiec</i>	<i>MOVENTO 100 SC</i>	0,75 l	14	Zwalczać po przekroczeniu progu zagrożenia. Ortus 05 SC stosować max-2 razy w sezonie. Movento 100 SC stosować po kwitnieniu, od początku rozwoju owoców do fazy dojrzewania. Limocide, Prev-AM, Presticol stosować od końca fazy kwitnienia do fazy początku zbioru owoców. *Stosować jeden z nich.	spinosad
		<i>LIMOCIDE 10 SC</i>	2,0 l	1		olejek pomarańczowy
		<i>ORTUS 05 SC</i>	1,5 l	21		fenpiroksymat
		<i>PREV-AM*</i>	2,0 l	1		olejek pomarańczowy
		<i>PESTICOL*</i>	2,0 l	1		olejek pomarańczowy
		<i>SILTAC EC</i>	0,15%	nd		polimeryczne związki silikonowe
		<i>EMULPAR 940 EC</i>	0,9-1,2 %	nd		olej rydzowy i środki emulgujące
25	<i>muszka płamoskrzydła</i>	<i>MAX SPIN*</i>	0,32-0,4 l	3	Zwalczać na zagrożonych plantacjach, krótko przed zbiorem owoców. Pierwszy zabieg w okresie dojrzewania owoców po 3-4 dniach od stwierdzenia szkodnika w pułapkach. *Stosować jeden z nich.	spinosad
		<i>DECIS EXPERT 100 EC</i>	0,125 l	7		deltametryna
		<i>SPIN TOR 240 SC*</i>	0,32-0,4 l	3		spinosad

L.p.	Zwalczane szkodniki, choroby	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Karencja w dniach	Uwagi	Substancja czynna
Porzeczka czarna - PO ZBIORZE						
26	chrząszcze opuchlaków	Zwalczanie może być potrzebne tylko na zagrożonych plantacjach. Obecnie brak zarejestrowanych środków ochrony roślin do zwalczania tych szkodników. Ograniczane są podczas zwalczania przyszczarka pędowego i przeziernika porzeczki.				
27	amerykański mącznik agrestu	ZATO 50 WG	0,2 kg	nd	Po dużym nasileniu choroby opryskiwanie wykonać bezpośrednio po zbiorze, a drugie po 10-14 dniach.	trifloksystrobina
		TOPAS/ PENKONA 100 EC	0,5 l	nd		penkonazol
28	antraknoza (opadżina) liści porzeczki	ZATO 50 WG	0,2 kg	nd	Na plantacjach, na których występują choroby, opryskiwanie wykonać bezpośrednio po zbiorze, a następnie po 14 dniach.	trifloksystrobina
29	przszczarek porzeczkiowiak liściowy, przszczarek porzeczkiwiec pędowy	MOSPILAN 20 SP*	0,2 kg	nd	Zabieg wykonać bezpośrednio po zbiorze owoców i na silnie zasiedlonych plantacjach, powtórzyć 1-2 razy w odstępach 10- dniowych. *Stosować jeden z nich.	acetamipryd
		MIROS 20 SP*	0,2 kg	nd		acetamipryd
		LANMOS 20 SP*	0,2 kg	nd		acetamipryd
		SEKIL 20 SP*	0,2 kg	nd		acetamipryd
30	przędziorek chmielowiec	ORTUS 05 SC	1,5 l	nd	Dokładnie opryskiwać dolną stronę liści. *Stosować jeden z nich.	fenpiroksymat
		KOROMITE 10 EC*	1,25 l	nd		milbemektyna
		MILBEKNOCK 10 EC*	1,25 l	nd		milbemektyna
		SILTAC EC	0,15%	nd		polimeryczne związki silikonowe
		EMULPAR 940 EC	0,9-1,2%	nd		olej rydzowy i środki emulgujące
31	przeziernik porzeczkiowiec	Brak dostępnych środków do zwalczania tego szkodnika				

ZWALCZANIE CHWASTÓW						
L.p.	Substancja aktywna	Nazwa środka	Dawka na 1 ha	Uwagi dotyczące stosowania		

Środki do stosowania przed wschodami chwastów						
1	pendimetalina	STOMP AQUA 455 CS	3,5 l	Stosować na przynajmniej rocznych lub starszych plantacjach, wczesną wiosną, w okresie spoczynku roślin uprawnych. Karencja- 80 dni.		
2	napropamid	DEVRIOL 450 SC COLZAMID	plantacje nowo założone 3,0-4,0 l	Stoować wczesną wiosną przed ruszeniem roślin lub jesienią, po zbiorze owoców, w okresie wilgotnej i chłodnej pogody. Na plantacjach owocujących stosować do 15 października. Wykonywać tylko 1 zabieg w sezonie.		
			plantacje roczne i starsze 4,0-6,0 l			

Środki do zwalczania chwastów po wschodach						
3	fluazyfop-P-butyloowy	FUSILADE FORTE 150 EC TRIVKO PRIVUM 125 EC	0,6-1,0 l 0,75-1,0 l 0,75-1,0 l	Na chwasty prosozate od fazy 2-3 liści krzewienia. Okres karencji- 90 dni.		
4	fluazyfop-P-butylowy	FORTUNE	0,6-1,0 l			
5	cyklohesanodion	SELECT SUPER 120 EC GRAMIGUARD	0,8-1,0 l	Na chwasty prosozate od fazy 2-3 liści krzewienia. Okres karencji- 30 dni.		

nd - nie dotyczy

UWAGA :

Odpowiedzialność za skuteczność działania ⁽¹⁾ i fitotoksyczność ⁽²⁾ danego środka ochrony roślin stosowanego w wymienionej uprawie ponosi wyłącznie jego użytkownik !

(1) skuteczność działania : środki stosować zgodnie z przeznaczeniem po dokładnym zapoznaniu się z etykietą, dobierać właściwy środek, nie dopuszczać do przekraczania dawek , okresów karencji, nie opóźniać zabiegu, przechowywać środki ochrony roślin w szczelnie zamkniętych pojemnikach

(2) fitotoksyczność : niekorzystny wpływ "toksyczny" substancji na rośliny, np. przekraczanie dawek środków ochrony roślin w zabiegach agrotechnicznych, tj. pestycydów, herbicydów lub fungicydów

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją załączoną w etykiecie.

Chłodnia PREMIUM informuje, że 2023 roku upływa termin zużycia zapasów następujących środków oraz NIE wolno ich stosować po określonym terminie.

BIGALO (31.07.2023)